

Fungisan bezchlorový je především protiplísňová, antibakteriální a algicidní kapalná přísada k ochraně zdiva do vodou ředitelných malířských nátěrových hmot a jiných minerálních stavebních materiálů. Lze jej aplikovat v bytových a nebytových prostorách, v průmyslových i potravinářských provozech, veřejných budovách do interiéru i exteriéru. Je účinný i v místech s extrémními podmínkami (např. vývažovny, prádelny apod.).

**Návod k použití:** Plíseň před aplikací neodstraňujte! Napadená místa postříkejte přípravky na likvidaci plísní FungiSPRAY chlorový nebo FungiSPRAY bezchlorový, výrobce STACHEMA CZ. Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat. Aplikujte nátěrem nebo postříkem na suchý očištěný povrch (viz tabulka). Při silném napadení proveďte první nátěr 5% vodným roztokem a po zaschnutí aplikujte nátěr (viz tabulka).

**Vydatnost:** Z 1 kg koncentráту se ošetří cca 50 - 100 m<sup>2</sup> plochy podle vydatnosti použité nátěrové hmoty (malířské nátěry).

Redění aplikačních nátěrů		
010	010	010
010	010	010
010	010	010
010	010	010

**Přípravek i aplikační nátěr s přípravkem před použitím řádně promíchejte!**

**Skladování:** v původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem!

**Záruční doba:** 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

**Upozornění:** Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

**Obsahuje:** 4,5 g/kg pyrithion zinečnatý; 4,5 g/kg 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; 8 g/kg terbutryn.

**R-věty:** Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

**S-věty, první pomoc:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nevylévejte do kanalizace. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem vody. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou.

**Likvidace:** Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Datum revize: 12.11.2013